BIO-CROP
PRODUCTORES DE INSUMOS AGRICOLAS

RAXTER MIX WP Insecticida

FICHA TÉCNICA

FT 1024
Actualizada: 2024-05-01
Versión: 4
Revisión: 2024-10-01

RAXTER MIX®W.P. es un insecticida producido con una cepa patógena natural y selectiva de ***Metarhizium anisopliae***, ***Beauveria bassiana***, ***Bacillus thuringiensis***, ***Bacillus popilliae***. Capaz de parasitar insectos del orden Homóptera, Hemíptera y Coleóptera principalmente.
Cuando las esporas de **RAXTER MIX®W.P.** entran en contacto con el cuerpo del insecto germinan e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan. Una vez dentro, el hongo libera toxinas que destruyen la hemolinfa, causando trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, provocando la muerte del insecto entre 4 y 7 días después de la infección.

1. COMPOSICION GARANTIZADA.

Composición Garantizada	*Metarhizium anisopliae*:	2.0 x 10^8 UFC/gramo
	Beauveria bassiana:	2.0 x 10^8 UFC/gramo
	Bacillus thuringiensis:	2.0 x 10^8 UFC/gramo
	Bacillus popilliae:	2.0 x 10^8 UFC/gramo
Humedad:	Máximo: 7%	
Formulación:	Polvo mojable	

2. CULTIVOS Y DOSIS.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Arroz	*Tagosodes sp.* *Eutheola bidentata.* *Tibraca sp.* *Chizas.*	500 g - 1 Kg/ ha	Repetir a los 15 días.
Caña y Pastos	*Homoptera, Hemiptera (Salivazos, chinches)*	1 - 2 g / Litro de agua.	Repetir a los 15 días.
Ornamentales	*Chizas*	50 g / cama	Repetir a los 15 días (en drench).
aguacate	*Chizas, Picudos, Cochinilla, Trips, Áfidos.*	1 - 2 g/ Litro de agua.	Repetir a los 15 días (en drench).

Café	*Chizas, picudos y escamas*	1 g/L	Repetir a los 15 días.
Frutales (Piña, Melón, Sandía, gulupa, piña, uchuva, fresa, lulo, maracuyá, entre otros.)	*Chizas, Picudos, Trozadores, Trips, Áfidos*	500 g- 1Kg/ ha	Repetir ate presencia de la plaga.
Cítricos	*Chizas, Picudos, Cochinilla, Trips, Áfidos.*	1-2,5 g/L	Repetir a los 15 días.
papa	*Chizas*	1 kg/ha	Al momento de la siembra o inyectado en el desyerbe
Hortalizas (Lechuga, repollo, tomate, repollo, Lechuga, Espinaca, brócoli y otros.)	*Chizas, Picudos, Trozadores, Trips, Áfidos*	500 g- 1Kg/ ha	Repetir ate presencia de la plaga.
Plátano Y Banano	Picudo: *Cosmopolites sp.* Picudo: Metamasius sp. Picudo: Rhychosporus sp.	1 - 2 g/ Litro de agua.	Repetir a los 15 días.

3. PRESENTACIÓN.

- Bolsa 200g
- Bolsa 500g
- Bolsa 1Kg
- Bolsa 20Kg

4. CONSERVACIÓN.

Para almacenamiento manténgase a temperatura ambiente bajo sombra, en lugares secos y aireados.

BIO-CROP PRODUCTORES DE INSUMOS AGRICOLAS	RAXTER MIX WP Insecticida **FICHA TÉCNICA**	**FT 1024** **Actualizada: 2024-05-01** **Versión: 4** **Revisión: 2024-10-01**

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA.

- Sin concepto toxicológico.

6. COMPATIBILIDADES.

- Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes.
- No debe usarse en mezcla con Fungicidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.

7. PRECAUCIONES.

- Insecticida de uso agrícola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No congelar.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 1 hora.
El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 1 hora.

8. No-GMO1.

Los microorganismos presentes en el producto **RAXTER MIX wp**, no están genéticamente modificados, no son patógenos y son 100% naturales.

9. EMPRESA PRODUCTORA.

BIO-CROP S.A.S.
Registro ICA de Productores 2604
Directo Clientes: (+57) 311-7134696 / (+57) 310-2457694
Oficina PBX: (+57) 310-4015754 / (+57)-602-2864646 ext. 2
Carrera 24 Nº 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia.
Página web:www.bio-crop.com